インドリンスピロアミナル骨格を有する Neoxaline の全合成

北里大院感染制御¹、北里大生命研²、北里大薬³ ○井手口哲也¹、山田 健^{1,2}
白畑辰弥³、廣瀬友靖^{1,2}、菅原章公^{1,2}、小林義典³、大村 智²、砂塚敏明^{1,2}

Neoxaline (**1**) (Fig. 1)は、真菌 *Aspergillus japonicus* Fg-551 の培養液より単離されたインドールアルカロイドであり¹⁾、細胞周期阻害活性を示す。Neoxaline (**1**)は類例のないインドリンスピロアミナル骨格、橋頭位4級炭素上に存在するかさ高いリバースプレニル基と *E*-デヒドロヒスチジンを併せ持ち、その絶対立体構造は未決定である。また、インドリンスピロアミナル骨格を有する天然物の全合成の報告はなく、本骨格が生物活性に与える影響も解明されていない。今回我々は **1** の全合成と絶対立体構造の決定を目的に、リバースプレニル基の立体選択的導入、インドリンスピロアミナル骨格と *E*-デヒドロヒスチジン部の構築を鍵とした **1** の全合成研究に着手し、**1** の初の不斉全合成を達成し、その絶対立体構造を Fig. 1 に示すように決定したので報告する。

1. 逆合成解析

Neoxaline (**1**)はインドリンスピロアミナル **3** とアルデヒド **2** のアルドール縮合で合成できると考えた (Scheme 1)。インドリンスピロアミナル骨格はインドリン **4** から、三回の酸化と二回の環化 (ヒドロキシアミンへの酸化、ニトロンへの酸化、6員環化、環状ニトロンへの酸化、5員環化)を経て構築できると期待した。インドリン **4** はフロインドリン **5** から導き、リバースプレニル基は光学活性 3*a*-ヒドロキシフロインドリン **6** の不斉を利用することで立体選択的に導入できると予想した。

Scheme 1

2. 立体選択的なリバースプレニル基の導入

既に我々はトリプトフォールに対し香月シャープレスエポキシ化の条件を適用することで光学活性な **6** の合成法を報告している²⁾。今回は(-)-**6** (>99% *ee*)を用いて **1** の全合成に着手した。まず、(-)-**6** の二級アミンを Alloc で保護した後、水酸基をトリクロロアセトイミデートへ変換することで **7** を合成した (Scheme 2)。得られた **7** に $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ 存在下、プレニルトリブチルすず **8** を反応させたところ、立体選択的にリバースプレニル基が導入されたフロインドリン体 **9** が高収率で得られた。続いて **9** を4工程でアルデヒド **10** へ変換した後、ホウ酸存在下、イソシアニド **11** を作用させ、 α -ヒドロキシアミド **12** をジアステレオ混合物 (9*S*:9*R*=2:1) として得た。

Scheme 2

3. インドリンスピロアミナル骨格の構築

合成した **12** を種々官能基変換して得たインドリン(**9R**)-**13** を用いてインドリンスピロアミナル骨格の構築を検討した (Scheme 3)。即ち(**9R**)-**13** をタングステン酸ナトリウムを用いてニトロソへ酸化した後、塩基で処理することで環状体 **14** を得た。次に、**14** を $\text{Pb}(\text{OAc})_4$ を用いて環状ニトロソ **15** へ酸化し、TBAOH で処理することにより、インドリンスピロアミナル(**9R**)-**16** を単一のジアステレオマーとして高収率で得た。また、9位ジアステレオマーである(**9S**)-**13** からのインドリンスピロアミナル骨格構築も検討したが、(**9S**)-**16** は得られなかった。

Scheme 3

4. デヒドロヒスチジン部分の構築及び Neoxaline (**1**)の合成

インドリンスピロアミナル(**9R**)-**16** に対して、アルドール反応によるイミダゾールユニットの導入を検討したが、12位の脱プロトン化によるエノラート形成が困難だった。そこで **16** の水酸基、及びアミドを保護することとした。検討の結果、水酸基は TBS 基、アミドは SEM 基で保護することができ、得られた **17** とアルデヒド **18** とのアルドール反応により、三種のジアステレオマー **19a-c** が得られた (Scheme 4)。主生成物である **19a** を EDC と CuCl_2 を用いて脱水したところ、*Z*-デヒドロヒスチジンを有する **20** が選択的に得られた。次に **20** の *N*-ヒドロキシドの TBS 基を選択的に除去し、生じた水酸基をメチルエーテル化して *N*-メトキシインドリン **21** を得た。続く **21** の SEM 基と Boc 基の除去は Me_3Al を用いることで9位のエピメリ化を伴って達成された。得られた **22** の水酸基を HF・ピリジンを用いて脱保護して、Neoxaline (**1**) の *Z*-幾何異性体である **23** を合成した。最後に、**23** に対して MeOH 中で光照射 ($\lambda < 325 \text{ nm}$) を行ったところ共役二重結合の異性化反応が進行し、**1** の初の全合成を達成した。合成した **1** の各種 NMR スペクトル、及び比旋光度は天然物と完全に一致した。

Scheme 4

5. 参考文献

- 1) (a) Hirano, A.; Iwai, Y.; Masuma, R.; Tei, K.; Ōmura, S. *J. Antibiot.* **1979**, *32*, 781. (b) Konda, Y.; Onda, M.; Hirano, A.; Ōmura, S. *Chem. Pharm. Bull.* **1980**, *28*, 2987.
- 2) Sunazuka, T.; Hirose, T.; Shirahata, T.; Harigaya, Y.; Hayashi, M.; Komiyama, K.; Ōmura, S.; Smith, A. B., III *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 2122.